

Contorno de ojos

Corrección de párpados superiores

El área de los ojos constituye en la mayoría de las personas el eje central del rostro y por lo tanto el punto más importante para determinar la apariencia física.



En el caso del párpado superior, la técnica consiste en vaporizar el excedente de piel arriba y abajo del pliegue y al volver a unir los bordes internamente, no hay puntos que retirar. La cicatrización es exactamente sobre el mismo pliegue, por lo que después de un tiempo se vuelve imperceptible y la recuperación es muy rápida.

El láser de CO2 ultrapulsado es un equipo de alta tecnología utilizado en el procedimiento denominado Blefaroplastia (corrección de párpados). Ventajas del Láser sobre el bisturí en la Blefaroplastia:

- Corte Preciso
- Menor riesgo de moretones
- Contracción de la Piel
- Mejor cicatrización
- Más rápida recuperación



Blefaroplastia


Número de sesiones:
1
Anestesia:
Local o sedación
Duración del procedimiento:
Aproximadamente una hora
Tiempo y forma de recuperación:
4 a 5 días con inflamación
6 a 7 días con ligera costra lineal
Áreas a tratar:
Párpados superiores
Condiciones o Padecimientos:
Párpados caídos
Duración del efecto:
De 7 a 10 años

Corrección de Párpados Inferiores (Bolsas debajo de los ojos)

En el caso de las bolsas debajo de los ojos, la vaporización del exceso de grasa se realiza mediante una pequeña ventana que se hace con el mismo láser en la conjuntiva del párpado inferior (por dentro) sin necesidad de cortes ni suturas, por lo que la recuperación es cuestión de pocos días con una moderada inflamación del área tratada e irritación mínima de los ojos y sin ningún tipo de cicatriz visible.



ANTES



DESPUES

Lipoinjerto

Recientemente hemos desarrollado la transferencia autóloga (de uno mismo) de grasa o lipoinjerto, un método innovador para reutilizar la grasa extraída de las bolsas del párpado inferior en las ojeras hundidas inyectándola directamente con excelentes resultados y periodo de recuperación muy breve.

Este procedimiento consiste en la reimplantación de células grasas del mismo paciente con la finalidad de dar volumen en aquellas partes que presenten falta de tejido, corrigiendo los defectos por envejecimiento prematuro o atrofia de la grasa.



ANTES



DESPUES

Lipoinjerto en ojeras

Número de sesiones:

1

Anestesia:

Local o sedación

Duración del procedimiento:

Aproximadamente una hora

Tiempo y forma de recuperación:

4 a 5 días con inflamación moderada
Inflamación leve durante 2 semanas

Áreas a tratar:

Párpados inferiores

Condiciones o Padecimientos:

Ojeras hundidas

Duración del efecto:

De 7 a 10 años

Dr. Héctor Leal Silva

CIRUJANO DERMATÓLOGO

Céd. Prof. 13608252; UDEM/UNAM

Cert. por el Consejo Mexicano de Dermatología No. 510

Céd. de Especialista en Dermatología No. 5446146

www.iderma.org



/iDermaMX



/iDermaMX

iDerma.org

Dermatología-Láser-Cirugía Cosmética

Belisiario Domínguez #2309
Colonia Obispado, Monterrey, N.L.
Lada sin costo: 01-800-716-5207
83-48-10-29/83-33-33-08